歷代名醫脈訣精華
張廷錫 輯
洋裝一册 三元五角
平裝四册 價洋三元

楊上善 輯
診斷學彙編
四册 八角

◎丁履中集註 ◎徐召南評批
古本難經闡註
◎全書一厚册 ◎定價洋六角

脈訣指掌圖
朱丹溪 著
一册 三角

上海三馬路望平街口
千頃堂書局發行

霍亂叢談

陳少卿

緒言

霍亂者。即西醫所謂虎烈拉也。簡稱虎疫。考霍亂之發現。我國在軒岐時。已有是名。內經有霍亂之論。漢張機在傷寒論中。亦有霍亂篇。唐千金外台。俱有霍亂之方。金元明諸大家。別爲乾霍亂。與濕霍亂之說。迨至清季。有王孟英創熱霍亂。寒霍亂。濕霍亂之分。故霍亂一症。在我國醫學上。已數見不鮮矣。惟西醫之所謂虎烈拉。於西歷一八一六年。始發現流行於印度半島。五六年間。遍傳於亞非二洲。隔三年。又暴發於歐非美三洲。禍及十二年而止。一八四六年。復發現於東亞。漸西及於波斯。北轉入俄法英諸國。橫流幾臺全球者。凡十有七年。息末二年。又烈於世者十三年。繼後發現凡三四次。迨德醫查得可實發明細菌。始有鹽水注射之治法。間今年又以暴發聞矣。是不可不加以注意焉。是症一經傳染。猝然心腹脹痛。吐利交作。揮霍撩亂也。故經曰『清氣在陰。濁氣在陽。清濁相干。亂於腸胃。則爲霍亂。』其殺人之厲。傳佈之速。言之變色。重者往往數小時內斃命。可不懼哉。

西醫謂一種霍亂菌。繁殖於汚穢之所。由蒼蠅之媒介。附着於食物。傳入於人身。乃在身內潛伏。一面繁殖發育。散佈遍體。如身內細胞。不能抵抗。遂而暴發。其治法不外內服哥羅顛十滴水及注射樟腦針鹽水針而已。稽諸我國古籍。霍亂病因之由於汚物而生者。早已發明。如傷寒直解云『霍亂者。不從表入。大邪從口鼻而入。直中於內。爲病最急。』又云。『痧者。天地不正之氣。濕熱薰蒸。從口鼻而入。』沈明宗金匱注云。『中惡之症。由臭穢惡毒之氣。直從口鼻。入於腸胃臟腑也。』古時科學未發達。不能明其爲菌。但穢物從口鼻而入。已闡發其理矣。

惟先賢論治。有專主乎熱。有專主乎寒。或專主於補。或專主於瀉。然補瀉寒熱之間。相殊天壤。稍一誤投。生命隨之。豈可孟浪雜投。草菅人命哉。惟霍亂一症。槩言之。別爲乾濕二種。二者之間。又當辨寒熱以施治。且病原之間。亦有不同。臨症之際。不可不審慎斷辨耳。

病理

夏秋之交。天時酷熱。人煙稠密之區。暑濕熏蒸。菌毒因之而發。空氣之中。時含有此種之毒。吾人呼吸之時。毒隨之而入肺。心肺有相連之脂膜。故由肺而傳入心胞。再由心胞而傳入三焦。——上焦心。下膈膜。中焦包脾連胃脂膜。下焦絡腸包腎脂膜——爲手厥陰少陽臟腑之相傳也。

其毒入三焦之後。如其人中氣充盛。無隙可乘。乃伏而不動。或隨大便而出。故西醫驗糞所得。謂健康之人。其糞內往往亦有霍亂菌者。即是故也。當菌毒伏於三焦之時。其人或飲食過量。或因寒涼傷其脾胃。將有吐瀉之勢。其毒即乘虛內襲。遂揮霍撩亂。而吐利交作矣。且胃之大絡虛里。小腸之乳糜管。皆與心相通。故菌毒有時由腸胃而入心。心有四支血脈管上通達腦。菌更由心而上竄於腦。致腦髓神經與心俱病。左心房輸血之力。與右心房收血之力。爲之頓減。是以週身血脈漸停。而通體皆涼也。

預防

邇來每於時疫流行之時。各地好善之士。多設時疫醫院。施打防疫針。以防於先。鹽水針以救於後。法意誠善。然平日之預防。亦不可不時加注意焉。人當酷暑蒸發之時。周身毛竅洩然齊開。或貪涼露宿。或居涼飲冷。於是菌即乘隙而入。此致病之一也。人之脾胃。每當暑熱。消化能力減少。若恣食油膩。因之積滯宿垢。停阻腸胃。菌即乘此而發。此致病之二也。經曰。『過汗傷津』。蓋汗爲人之津液所化。暑熱蒸發。週身時欲出汗。內部精髓。消爍耗損。故人當酷熱。每覺神怠志懈。若再恣於色慾。則精髓薄弱。抗菌之力減少。菌得因之而蔓延。此致病之三也。故吾人於夏秋之時。對於慎寒暑。節飲食。固精髓。綜此三者。能時加注意。則霍亂毒菌。是不能乘隙而入。否則。雖打防疫針。亦何補哉。

（未完）

脈學指南

▲全書裝訂四册　▲定價一元二角

吾國醫學，爲世界最古之哲學，亦最切實用之藝術，奈歧景之書，理極深奧，後人著述，蕪雜居多，欲求闡發奧旨，洞明虛實之作，實不多覯，本局有見于此，故醫學書籍，多方搜求，印行濟世，茲復得山左盧敬之先生所著「脈學指南」一書，遍請上海著名醫家評閱，僉謂精微透徹，發前人所未發，足爲後學津梁，並略撮是書優點，以告有志研究者，諒當先覩爲快也？

▲是書專取「內經」「難經」「傷寒論」「金匱要略」等書，融會貫通，發爲議論，所謂以經解經，洵非學有根底者不能道。與徒逞臆說者，有霄壤之判，

▲是書說明脈之形象，及病之所以然，以及種種變化，熟讀之，臨診辨症，自能確有把握矣。

▲是書雖祇八萬餘言，然頗簡明，於脈症互勘處，晰疑辨難，已屬無微不彰，以少勝多，實爲字字珠璣。

▲是書經大文豪章太炎先生序首，其價值如何，概可想見，書用本國上等連史紙精印，清朗悅目，猶其餘事，

上海三馬路 千頃堂書局發行

上海幸福書局出版

書名	册數	價目
百病自療叢書	十册	實售大洋一元六角
家庭醫藥常識	一册	實售大洋八角
婦女病初集	一册	實售大洋五角
婦女病續集	一册	實售大洋五角
[illegible]	一册	[illegible]
保嬰新書	一册	實售大洋四角
怪病奇治	一册	實售大洋一元
花柳病治療學	一册	實售大洋三角
咳嗽自療法	一册	實售大洋二角
幸福報第七集彙訂	二册	實售大洋一元四角

書名	册數	價目
虛勞五種	一册	實售大洋五角
民衆醫藥常識	四册	實售大洋二元二角
實用驗方	一册	實售大洋五角
家庭醫藥顧問	一册	實售大洋二元
國民醫藥須知初集	一册	實售大洋[illegible]
國民醫藥須知二集	一册	實售大洋一元八角
遺精病論	一册	實售大洋五角
丁甘仁醫案	四册	實售大洋二元四角
清代醫案精華	四册	實售大洋二元四角
清代醫話精華	四册	實售大洋二元四角

書名	册數	價目
中國醫藥講義	[illegible]册	實售大洋八元
醫學南針	二册	實售大洋一元二角八分
中國針灸治療學	一册	實售大洋二元八角
衛生實鑑	四册	實售大洋二元[illegible]分
衛生叢話二集	一册	實售大洋四角五分
衛生叢話三集	一册	實售大洋四角五分
衛生叢話四集	一册	實售大洋五角
學校衛生要旨	一册	實售大洋四角五分
失眠自療法	一册	實售大洋二角
痨病自療法	一册	實售大洋二角

地址 上海三馬路雲南路轉角

長壽

于右任題

每份四分　第十期

中華民國念一年八月十二日

每逢星期五出版　全年五十期　連郵二元　國外加倍

霍亂專號目錄

全林生活史之一段
霍亂寒熱之辨治並闡通俗急救法之不合
乾霍亂治法
痧疫與霍亂之分別
飲食與霍亂
霍亂注射鹽水針以後
時疫談
濕霍亂
霍亂妙方
鄉僻僻壤急救霍亂之法
乾霍亂
霍亂轉筋
眞霍亂初起方
霍亂回陽法
霍亂與吊脚痧
霍亂叢談

◎本報定閱處上海三馬路望平街口千頃堂書局◎

◎本報特聘請吳之屏方家楨大律師爲常年法律顧問◎

阿戇全林生活史之一段

生龍活虎之人 屈伏於微生菌

賭吃……招來大禍一場　飲洗馬桶水二碗

……險些兒闖入鬼門關……

（懷鳳）

霍亂之症。患者雖覺其驟然而來。變生頃刻。然其病之醞釀。每非一朝一夕之故。有於病前二三日。已覺胃納不佳。飲食無味。或精神怠倦。四肢無力。或因感涼及傷食。誠卸其抵抗力。事前不加防範。不知休養。而遺病毒以侵襲之機。否則體魄堅強。抵抗力豐富。縱有傳染。其病即可消滅。或重病可以轉輕。已故俞鳳賓醫師。述其師立物司博士。嘗飲培養之霍亂菌一小杯。以試驗抵抗力與霍亂之關係。結果僅患三次水瀉。並無其他不適之感。此皆調養有素。有豐富之抵抗力。故不受病毒之影響。常見霍亂患者。多爲精力強壯之勞動家。在理病菌原無侵襲之可能。惟彼輩有恃無恐。不求保養之道。竟屈伏於不足道之微生菌。阿戇全林之染霍亂。即其一例。

全林。方姓。世業農。人以其渠勤剌忽。性情率直。故以阿戇名之。阿戇既不貪財。又不好色。惟愛吃愛喝。其飯量之大。直堪驚人。輿人賭吃。一餐盡饅首二十枚。大麵三碗。飯五大碗。彼恃其強盛之消化力。與壯健之體魄。絕少病魔之侵擾。居恆以此驕人。一日。時當盛夏。勞役於炎日之下。既煩悶而又疲憊。晚又輿儕輩賭食。夜半腹脹而痛。繼以吐瀉。時適霍亂流行。鄉間無良醫。不及救治。死亡相繼。阿戇於傷食之後。腸胃抵抗力薄弱。霍亂菌乘機發動。吐瀉不止。初則腹痛便溏。繼則腹不痛。便下如米泔水。瘧螺吊脚。諸消並作。刮痧無效。挑痧無效。仙方亦無效。城中雖有中西醫。雇舟載往城中。往返需時。半途恐生危險。城中雖有汽油船可雇。又無力担任此船費與出診之醫費。時在夜半。尤難設法。其計既窮。瞑目待斃。適其鄰居來一親戚。亦見義勇爲者。謂此症以洗「馬桶」時。刷下之泡沫水。與病人服之。可以救治。阿戇急於求活。不顧汚穢。倩人以馬桶刷之。飲有泡沫之水。味甚甘。盡二碗。其病果愈。

懷鳳氏曰。霍亂一症。有乾濕寒熱之別。其中陰寒霍亂爲西醫所稱虎列拉之眞性霍亂外。餘皆爲腸胃病。其蔓延力不大。故不能流行。古籍所載及民間流傳之霍亂單方。以治腸胃病則可。以治眞霍亂。恐不能對病。難於收效。阿戇所染。確爲眞性霍亂。以刷馬桶水治之而愈。此方既不載於書籍。民間亦少流傳。余以其法之不經。而又穢惡不堪。初不之信。乃實地調查。確有此事。並悉每年於霍亂流行之時。以此水飲之。無不收效云。

問答

本欄問答以本報之定戶爲限

（問）大吐大瀉。腿足轉筋。脈伏肢冷。汗多煩躁。欲坐井中之狀。口渴不多飲。形肉既然削瘦。請問治法。

（答）寒疫不正之邪。挾滯互阻。太陰陽明爲病。清濁混淆。升降失司。大吐則傷胃。大瀉則傷脾。脾胃兩傷。肝木來乘。寒過經隧。腿足轉筋。所由來也。濁陰盤踞。眞陽不伸。無以通達經脈。以致脈伏肢冷也。汗多煩躁。欲坐井中之狀。此陰邪盛於內。陽氣越於外。陰盛格陽。內眞寒而外假熱也。肌肉爲脾胃所主。脾陽已敗。胃不得溫分肉。充肌膚。故陡然削瘦。脈證合參。恐有陽亡虛脫之險。勉擬附子理中湯。合白通湯加減。囘外散之陽。驅內盛之陰。未識能有挽囘否。熟附塊一錢。焦白朮一錢五。炙甘草四分。淡吳萸四分。川雅連四分姜炒。六神曲二錢。淡干姜八分。葱白頭一個。猪胆汁沖服四滴。

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

霍亂寒熱之證治並闢通俗急救法之不合（朱振聲）

四時皆能生病。而以夏秋爲尤多。且以霍亂爲最烈。霍亂由於飲食不節。起居不時。穢溼雜邪。傷其正氣。以致揮霍撩亂。吐瀉交作。險象環生。往往不救。此症有寒熱二種。稍不辨明。亂投藥餌。生死立判。千里毫厘之際。豈可不詳爲細辨哉。

以言舌苔。熱症則白燥或黃燥。雖間有白膩苔。邊尖必絳赤。甚則其苔乾黑而燥。寒症則白滑而潤。或灰黑而滑。或灰黃兼白滑。以言二便。熱症則肛門灼熱。瀉出之物。臭穢異常。小便短澀。甚則涓滴不通。寒症則肛門不熱。下利澄澈如米泔水。小便清淡而長。或因泄水過多。小便雖清而不多。同是揚手擲足。熱症則心煩脘悶。袒腹仰臥。或輾轉反側。兩足排開。手不近身。或撫心拍胸。欲揭去衣被。寒症則心煩而脘不悶。每多踡臥。膝腿偎依。其手或按腹臂。或附脇。喜近衣被。身體重。同是口渴欲飲。熱症則喜飲冷物。如飲熱物。則胸中似怔。入口即吐。如飲冷物。則胸悶頓暢。嘔吐亦緩。寒症則喜飲熱物。即或有假喜飲冷物者。飲下後胸中必不暢適。不若熱飲之快爽也。

至於治法。熱症初起。用霍香。半夏。川連。黃芩。滑石。淡豆豉。扁豆衣。製半夏。竹茹等。甚則加石膏。竹葉。或飛龍奪命丹二分冲服。熱霍亂多由傷食而起。雖見泄瀉。仍宜加入消導之品。如內金。建曲。穀芽等。寒症初起。用吳萸。（川連拌）桂枝。乾姜。焦朮。茯苓。白芍等。甚則加木瓜。附片。黨參。定能收效。

普通之人。於醫學常識本素缺乏。不知何者爲霍亂。更無論寒熱之辨矣。一見倦怠勞疲。手足發冷。胸悶不舒。吐瀉交作。卽命之發痧。於是藥石雜投。意見百出。輕症固屬無妨。若重症則醫治失時。往往誤事。通俗所用之急救法。雖有可取。而霍亂非霍亂混雜不分。寒霍亂熱霍亂含糊莫辨。以致張冠李戴。或倒施妄行。特闢其非而正其錯。爰舉最普通之六項通俗急救法。一一分述之。

（一）痧藥　痧藥有行氣通竅。辟穢殺蟲之功。每日作預防用。服食數丸。未嘗無效。若以之治寒霍亂。毫不相干。故不發生效力。人丹性質。與痧藥畧同。

（二）行軍散　行軍之時。長途跋涉。既爲炎日所逼。又限於軍令。不能退縮休息。往往中暑昏倒。此散取其通竅。可治氣閉。深合於中暑一症。爲行軍時必備之品。故以行軍二字名之。治霍亂不論寒熱。皆無效驗。紅靈丹。臥龍丹。大致相同。

（三）十滴水　十滴水乃最近流行之通俗急救用品。急救霍亂。甚有效驗。惟中有雅片及樟腦。不可多服及常服。且重篤之霍亂症。亦非僅服十滴水所能奏功。

（四）樟腦白蘭　藥性與十滴水畧相同。惟不摻雅片。功力較十滴水稍次。

（五）刮痧　有一種刺激作用。施之於輕霍亂或有功用。寒霍亂及症之重者無效。

（六）挑痧　中暑昏迷。或能收效。霍亂則絕對無效。且挑撥之後。絡脈受傷。注射鹽水時。鹽水每於傷處外流。發生絕大影響。且業此者多無知之人。手術不周。其害甚大。

以上六項。最爲普遍。惟其普遍。故流弊孔多。讀者如能向親友傳述。明其取舍。以免僨事。則造福無量矣。

乾霍亂治法

何學明

乾霍亂者欲吐不吐。欲瀉不瀉。腹痛欲死。俗名絞腸痧者是也。急用鹽湯熱飲一二碗。探喉促吐。令宿食吐盡。不吐再服。吐訖復飲。三吐乃佳。如已成閉證。神昏不語。可用八寶紅靈丹灌之。刺痧挑痧等法。俱不效者。急以鹽填滿臍孔灸之。不計壯數。若神昏不語魄汗脈脫者不治。脈伏而神形不失。或按穴刺痧。或背刮痧。再以川鬱金。石菖蒲。廣霍梗。滑石。通草煎湯。冲入西牛黃二三分投之。

本症多由傷食而起。積滯於中。不得外達。脹痛難忍。在上脘用探吐法。如見痞滿燥實。腹臍耕痛。不可忍者。下證也。急用元明粉。大黃。枳實等下之。此以提吐爲逆施。就近下達。順其勢也。

乾霍亂大痛難忍。大汗大渴。舌黃燥刺。用川連絞水服之。汗止者生。汗不止者死。發躁亂語者。用地漿水（掘地爲坑。灌水。陶土使混。少頃。取其澄清之水。）調至寶丹冷服之。本症愈後。切不可與粥飲。下喉立危。宜餓一二日。亦不可與熱湯服之。

痧疫與霍亂之分別

宋愛人

世人每以痧疫與霍亂。混爲一談。藥石亂投。往往生變。不知二症之內因。截然不同。外證雖有類同。究有殊異。茲約畧述之。

痧疫多躁擾。霍亂多昏沈。此觀其神情之有異也。痧疫吐利之物均腸熱臭異常。兼有濁沫糞質。霍亂吐利之物。但覺其寒帶腥臭。與熱臭者適異。且渾白如米泔水汁。此診斷嗅覺之有異也。痧疫雖惡寒。雖有手足厥冷。而必時爲煩躁。袒胸露腹。表示其胸中之熱。霍亂則初起之時。四肢厥冷同。而復蓋衣被。絕不表示拒絕者。此寒熱眞假。可從形態分別者也。痧疫腹必呼痛。霍亂腹不痛。此腹候證察之不同者也。痧疫舌底必絳。舌苔必垢膩。甚則穢積寸許。堅如刷子。口氣臭惡。噴人欲嘔。霍亂之舌。必淡白無神。舌色不華。苔則不厚。此舌色舌苔之不同也。痧疫之脈。多脈不應證。頭痛壯熱。脈應洪實而反微遲。厥冷不語。脈應沈細而反滑數。亦有微緩細澀。浮大洪數。倏忽之間。倏疾不倫。或六脈俱伏。或一手單伏。或一部二部俱伏。霍亂之脈。三部均爲沈細。由沈細而爲沈微。由沈微而爲不續。蓋霍亂之最後一步。不外體溫減退。心臟衰弱。故其脈亦見此象。若霍亂陰寒之極。陽格於外。則脈搏忽爲浮大。惟著手重按。則豁然空虛。至骨則無矣。此脈搏之不同也。辨證既明。用藥庶無差忒矣。

飲食與霍亂

石燕華

霍亂不傳染於空氣。而多由飲食傳染。當夏秋之交。爲霍亂病流行之時。最宜注意飲食。試觀患霍亂者。多爲勞力苦工。不知衞生爲何事。於飲食之間。尤不知注意之故也。

霍亂既多由飲食不慎所造成。故以腸胃爲根據地。其病毒刺激胃部。則促起嘔吐。刺激腸部。促起泄瀉。名爲傳染病實卽腸胃病。

夏日蒼蠅最多。爲本病傳染之媒介。宜設法驅逐而撲滅之。蓋飲食之所以能誘發霍亂。有二道焉。其一卽食染有霍亂病毒之物。以致傳染。其二傷於飲食。消化器官受創。失其抵抗之力。不幸而染霍亂病毒。腸胃不能消滅之。受其侵襲矣。前者爲直接的。後者爲間接的。故愼飲食者。一面保持其內部之抵抗力。一面使病毒無傳染之機會。不特可免霍亂。亦可免一切病患。下列數端。最宜注意。

（一）飲水來源。須當注意。來源不潔。不可爲飲料。

（二）無論來源何等清潔之水。必煑沸之。最好備一沙濾缸。濾過之水。清潔無害。

（三）腐敗可疑之物。切不可食

（四）蒼蠅屯集之物。無論何等美饌。不宜食之。

（五）剖果實之刀。宜注意其清潔。

（六）蔬菜必先洗滌清潔。然後煑熟。煑熟後始可食。

（七）無論何種果實。可去皮者。必去其皮而食。

（八）荷蘭水。酸梅湯等。最不可靠。飲之危險殊甚。切不可飲。

（九）冰淇淋刨冰等太冷。於腸胃不宜。能勿食最佳。

（十）過含脂肪之物。最宜少食。以防胃腸之消化。發生障碍。

（十一）勿用他人碗箸。以防傳染。否則宜在沸水中洗過。

（十二）雇用婢僕者。宜注意其手指。是否清潔。並令其時常洗手。

朱振聲醫

上海新新公司 常年醫藥顧問

診例

（甲）門診一元　號金不收
（乙）出診四元　路遠遞加
（丙）膏丸方四元　隔日取件
（丁）外埠函病二元　原班回件
（戊）急病隨請隨到

時間　門診上午九時至十二時止　出診下午四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話　九一四九二

掛號處啓

本醫室代售各種良藥

保腦丸……專治腦漏……每盒五角
遺精散……專治遺精……每盒一元
白濁丸……專治白濁……每盒一元
神仁丹……專治時疫……每元三瓶
吐血靈丹……專治吐血……每盒五角
獺肝定痛散……專治肝胃氣痛……每盒三角

霍亂注射鹽水針以後

尤學周

注射鹽水。爲霍亂惟一之急救法。蓋鹽水之於霍亂。其功效有三。其一鹽水有撲滅病菌之可能。其二注射鹽水。可以冲淡其毒素而和解之。其三由吐瀉而失去之血中水分。得有補償。有此三因。故收效驗而且速。

霍亂初起先服十滴水。繼進辟瘟丹。可以應手而愈。辟瘟丹輕者服半粒重者服一粒。甚則二粒。用溫開水服。十滴水名與事實不符。名曰十滴。至少須服半小瓶。若拘泥十滴之名。僅服十滴。必無效驗。此非藥之不靈。因服量太少。不足以制病菌毒也。若吐瀉不止。大汗淋漓。手足發麻。甚至發冷。氣則漸急。除服十滴水辟瘟丹外。再用生附子一錢。淡乾姜一錢。淡吳萸一錢。小川連六分。製川朴一錢。姜半夏二錢。鮮霍香三錢。濃煎頓服。附子乾姜。隨症加減。有用至七八錢而見效者。惟一般醫家。恐招物議。不肯多用。病家之稍備藥性者。又恐其太熱。不肯卽服。故往往不能見效。此症至爲危急。一刻不容畧緩。其不敢服附子乾姜等熱藥者。切不可就救於挑痧之人。以致誤事。速卽送入時疫醫院。注射鹽水針。尚有挽救之望。

注射鹽水。有一次獲愈。有連行二次而愈者。有反復至數次而始得愈者。亦有注射以後。證雖輕減。而不能竟奏全功者。則又須審察證象。投以內服之劑。曩年先師朱少坡先生。每屆夏令。辦理和濟時疫所於閘北。以余忝爲該所國醫部主任者三年。對於此症之變化。知之獨詳。

有一面注射鹽水。一面瀉下不止者。有注射方畢。一陣泄瀉。水分盡去者。乃泄瀉太過。腸脂隨去。收固無力。用炒白朮錢半。煨益智錢半。煨肉菓八分。赤石脂五錢。（包）炒車前三錢。赤白苓各二錢。煎服。如不應。再加御米殼三錢。

霍亂而夾暑邪。注射鹽水後。霍亂雖平。暑邪未退。口渴煩躁。舌紅。或邊夾紅者。投黃連瀉心法。川雅連六分。淡黃芩二錢。天花粉三錢。連翹心三錢。炒竹茹二錢。益元散三錢。

注射鹽水後。其心臟受汗下之影響。衰弱而無鼓舞之力。元陽不易回復。四肢仍現厥冷。可用明附片一錢。淡乾姜一錢。生黨參三錢。焦白朮錢半。炙甘草一錢。濃煎服之。

霍亂大吐大瀉。腸胃虛弱。切忌食物。注射之後。須絕食一二日。不知禁食者。往往復發。重者再行注射。輕者玉樞丹加大黃六七分同服。

注射後。大勢已平。微有寒熱。且煩躁泛噁。乃餘邪未淨。所謂餘邪者。非霍亂病毒之餘波。內伏之暑溼未淸耳。製川朴六分。炒枳殼八分。炒青蒿錢半。天花粉三錢。六一散三錢。陳橘皮八分。生苡仁四錢。服煎。

時疫談

葉勁秋

釋「疫」

凡沿村闔戶。同時病同一的病狀者皆得曰疫。如喉痧。霍亂。瘧。痢。等等皆是。

釋「霍亂」

霍亂之病。傳染極易。死亡極速。爲速死病之一。諸疫中之一疫。

疫之原因

疫之發也。每在暴寒暴熱之時。久旱久雨之後。在天風爲媒介。在地水爲媒介。風之所不至。水之所不通。則疫之界限別焉。

傷寒例曰。「凡時行者。春時應暖而復大寒。夏時應大熱而反大涼。秋時應涼而反大熱。冬時應寒而反大溫。此非其時而有其氣。是以一歲之中長幼之病。多相似者。此則時行之氣也」。

霍亂之症狀

傷寒霍亂篇「病有霍亂者何。嘔吐而利。名曰霍亂」。

「病發熱頭痛。身疼惡寒吐利者。此名霍亂。自吐下。又利止復更發熱也」。

霍亂之治法

霍亂頭痛發熱。身疼痛。熱多欲飲水者——五苓散

寒多不欲飲水者——理中圓

普通方

萸連解毒湯

眞川連六分　淡吳萸一分　製半夏錢半
炒枳實錢半　淡黃芩錢半　大白芍錢半

善後方

銀花三錢　花粉三錢　浙貝三錢
薑皮三錢　通草一錢　竹茹錢半

防疫方

生明白礬一錢　生甘草三錢
生黑大豆五錢　淨銀花五錢

淫霍亂

沈仲圭

引言

內經云。陰陽易位曰霍。升降失常曰亂。傷寒論云。嘔吐而利。名曰霍亂。蓋夏令溼盛。人感其氣。鬱蓄中焦。復吸暑穢。或停飲食。遂致濁逆於上。清陷於下。陰陽混淆。揮霍撩亂。病狀之凶。死亡之速。無以過之。

證狀

上吐下瀉。腹痛胸悶。肢冷口渴。或不渴。脈伏。或沈緩。甚則轉筋入腹。腿搐。指紋癟。而呈危候。

治法

宜激濁揚清。和中化溼。如米仁。厚朴。蒼朮。茯苓。霍香。半夏。山梔。晚蠶砂。左金丸。車前子。大豆卷。宣木瓜之屬。

驗方

霍亂妙方

霍香二錢。神曲三錢。羌活二錢。蒼朮三錢。柴胡二錢。澤瀉二錢。木通一錢。好茶葉三錢加連鬚老葱二條淨水煎服。此方急救時症。嘔瀉肚痛抽筋等症。重者服三四劑。輕者一二劑卽愈。

鄉間僻壤急救霍亂法

鄉間僻處。忽患霍亂急症。倉卒無藥。急用生鹽一二斤。淨鍋內炒熱。用布分兩三包。如患胸前脹滿。心腹絞痛者。將熱鹽輪流熨胸腹等處。如鹽已冷。稍爲再炒。侯駁至氣透則愈。

如患轉筋者。定必四肢抽搐。將熱鹽輪流熨兩手彎。及兩足彎。取效甚速。

乾霍亂

乾霍亂絞痛難忍。用食鹽二兩。炒熱。滾水冲服。或吐或下卽愈。或用蕎麥一大撮。炒焦。以滾水冲下。待溫服之。如大痛難忍。大汗大渴。舌黃躁刺。用川連絞水服之。汗止者生。汗不止者死。

霍亂轉筋

霍亂轉筋。脚縮不伸。可用新汲井水一碗。入炒鹽二錢服。再取水一盆。浸兩足卽愈。

眞霍亂初起方

眞霍亂。腹不痛。所下如米泔水。用荊芥穗。防風。明附片。生白芍。澤瀉各二錢。製半夏。白茯苓。木豬苓各三錢。上廣皮。乾切桂枝各錢半。炙甘草一錢。炒吳萸八分。川連三分。生姜三片。煎服。

霍亂回陽法

霍亂吐瀉。陽亡肢冷。明吳萸水炒川連四分。明附片三錢。炮姜炭三錢。炙甘草錢半。水煎服。

霍亂與弔脚痧

張贊臣

弔脚痧者。卽霍亂之一種現象。非霍亂之外。另有所謂弔脚痧之病症也。脚部痙攣。有如膀牽筋。惟膀牽筋。由風冷外侵。氣不溫和。血液凝滯。腿筋牽結。突然凸拙而痛。除此而外。並無其他現象。全體亦不發生若何影響。弔脚痧則嘔吐瀉泄。大肉陷脫。目眶深凹。非若膀牽筋之限於局部。並無何種危險之可比。霍亂而致弔脚。實非輕淺。不容忽視矣。

吾人之筋膜。賴氣以煦之。血以養之。津液脂膏濡潤而轉之。於是開闔自然。伸屈如意。爲骨骼肌肉連屬之關鍵。霍亂一起。上見嘔吐。下見泄瀉。如決口崩堤。發而莫遏。元氣爲之衰敗。血液則以水分傾瀉無存。而立爲枯燥。筋膜失此種種之榮養。遂亦痙攣而不能屈伸自如矣。

霍亂而有弔脚現象發生。一面外治。一面服藥。外治法用麩皮加生姜片炒熱。布包。在痙攣處按摩。冷則炒熱之再熨。內服方用厚朴一錢。藿香二錢。乾姜八分。附片八分。扁豆三錢。陳皮一錢。枳殼錢半。木瓜三錢。車前子三錢。如不應。速打鹽水針。

介紹

中藥問題　葉勁秋編　每册二角　上海幸福書局代售